



Nové příspěvky [Hledání](#)

[Články](#) [Fauna](#) [Flóra](#) [Houby](#) [Chráněná území](#) [Literatura](#) [Odkazy](#) [Redakce](#) [Spolupráce](#)

[| Fauna >> Invertebrata - bezobratlí >> Arthropoda - členovci >> Insecta - hmyz >> Coleoptera - brouci >> Carabidae - střevlíkovití](#)

Carabus hungaricus - střevlík panonský

1. 10. 2008 vytvořil [Filip Trnka](#)

Pachystus hungaricus Fabricius, 1792 - střevlík panonský

Syn.: *Carabus hungaricus* Fabricius, 1792; *Carabus frivaldskyanus* Breuning, 1933; střevlík uherský

Čeľad: *Carabidae* - střevlíkovití

Status: [KO](#), [VU](#), [BERN II](#), [NATURA 2000](#), [HD II](#), [IV](#)

Popis: Větší druh střevlíka o velikosti 23-34 mm, zbarvení je černé se slabým leskem. Oči zřetelně vystupující, hlava hustě, jemně tečkovaná. Krovky hladké, s nepatrným jemným tečkováním.

Rozšíření: Panonský prvek známý z České republiky, Slovenska, Rakouska, Rumunska, Maďarska, Srbska a Bulharska. Zasahuje až na východní Sibiř.

V ČR dříve hojný druh na stepních lokalitách Moravy, dnes se vyskytuje pouze na jižní Moravě, kde má několik lokalit jako [NPR Pouzdřanská step-Kolby](#), [NPR Děvín-Kotel-Soutěska](#) a [Čejkovické Špidlázky](#). Nedávno byl opět zjištěn v PR Kamenný vrch u Kurdějova. Historicky se vyskytoval až k Prostějovu, k přírodnímu parku Kosíř, také byl nalézán v okolí Brna na Hádech. Dokonce je znám i výskyt z Čech z okolí Chomutova.

Biologie a ekologie: Stepní, xerothermní druh, který má pozdně letní až podzimní aktivitu imág. Dospělce najdeme od srpna, můžeme je často spatřit čile pobíhat. Vyskytuje se především na stepních biotopech, odkud proniká i na meze a okraje polí. Bylo zjištěno že preferuje dlouhostébelné trávnický. Živí se dravě, ale nepohrdne ani uhynulými živočichy, sám jsem několikrát pozoroval, jak napadli a požírali housenky bourovců ostružiníkových (*Macrothylacia rubi*). Přezimovává ve stádiu larvy.

Ohrožení a ochrana: Panonský prvek naší fauny, který je na okraji svého areálu. Je zařazen do druhů v příloze NATURA 2000, zákonem chráněný jako kriticky ohrožený, červeným seznamem označen jako ohrožený. Je ohrožen především ničením a zarůstáním lokalit náletovými dřevinami. Musí být dodržen náležitý management, jako prořezávky náletů a zamezení používání insekticidů v blízkosti lokalit na kterých se střevlík panonský vyskytuje. Nejdůležitější je udržet stepní charakter biotopů, jak prořezávkou tak mozaikovou sečí nebo pastvou. V ČR probíhá monitoring.

Taxonomická poznámka: Celkem je známo pět poddruhů, u nás poddruh *Pachystus hungaricus hungaricus*. Někteří autoři považují u nás vyskytujícího se střevlíka panonského za poddruh *Pachystus hungaricus viennensis*, ten by měl být však nejbliže v Rakousku.



[Hledat](#)



AKTUALITY

Najdete zde již více než **2900** druhů rostlin, hub a živočichů!



Literatura:

Hůrka K. (1996): Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Illustrated key. Carabidae České a Slovenské republiky. Nakladatelství Kabourek, Zlín.

© Natura Bohemica 2008 - 2025 ISSN 1805-126X