***Gynandrorhynchus vittipennis* (Fåhraeus, 1871)**

vittipennis Fåhraeus, 1871: 435 (*Brentus*).
nitida Calabresi, 1920d: 37 (*Mygaleicus vittipennis* var.); syn. n.
persimilis Damoiseau, 1963i: 46 (*Mygaleicus*); syn. Damoiseau, 1967a: 290.

Type depositories. *B. vittipennis*: NHRS (HT); *M. vittipennis* var. *nitida*: MSNG (LT!, PLT!), IRSNB (PLT!), MZUF (PLT!); *M. persimilis*: MRAC (HT!).

Distribution. Burundi, Cameroon, Democratic Republic of the Congo (ex Zaire), Equatorial Guinea (including Bioko Is. = Fernando Poo), Ethiopia, Gabon, Ghana, Ivory Coast, Kenya, Malawi, Republic of the Congo, Rwanda, São Thomé and Principe, Sierra Leone, South Africa, Sudan, Tanzania, Uganda.

Notes. Lectotype of *M. vittipennis* var. *nitida* (MSNG) designated on a specimen with the following labels: Principe, Roca Inf., D. Henrique, II.1901, 200-300 m, L. Fea/ *Mygaleicus vittipennis* Fahr. var. *nitida* n. Paralectotypes: 55 specimens (MSNG), 2 specimens (MZUF), Is. Principe Bahia do Oeste, V-VI.1901, 100-200 m, L. Fea/ "La Specola" Firenze, 9578; 2 specimens (MZUF), Is. Principe Bahia do Oeste, V-VI.1901, 100-200 m, L. Fea/ ex-coll. Senna/ "La Specola" Firenze, 9578; 5 specimens (IRSNB), Is. Principe, Bahia do Oeste, V.1901, L. Fea/ *Gynandrorhynchus vittipennis* (Fahraeus) *nitida* var. (Calabresi) R. Damoiseau det., 1962/ Paratype.

Damoiseau (1967a: 292) did not mention Fernando Poo and Nord Niassasee (Kleine, 1920c: 44) when he gave the species distribution.



Distribution

5 mm

Description in R. Damoiseau 1967a: 290.

FAHRAEUS. 1871, Oef. Vetens. Akad. Föhr., n° 4, p. 433 *(Brenthus).* — KLEINE, 1918, Arch- Naturg- *84,* A 11, p. 43 *(Mygaleicus);* 1936, Ann. Terv., Cat. Faun. Ent. C.B., Brenth., p. 39. — CALABRESI, 1920, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, 3a, 9 (49), p. 37 *(Mygaleicus vittipennis* var. *nitida).* — *J.* DE MUIZON. 1960, Faune Brenth. Afr., p. 200. — DAMOISEAU, 1963, I.P.N.C., P.N.C., fasc. 39 (2), p. 46 *(Mygaleicus persimilis,* syn. nov.).

Longueur: 7-17 mm. — Espèce toujours assez brillante, mais de coloration variable. Généralement, la tête, le rostre, les antennes et les pattes sont brun-rouge assez clair, le prothorax est brun-noir à noir de poix. Les élytres sont brun-jaune à brun-rouge avec un obscurcissement de la suture, du bord latéral depuis l'humérus jusqu'à la déclivité où la bande sombre rejoint transversalement la suture, parfois avec une tache sombre postmédiane. Mais l'obscurcissement peut envahir toute la surface du disque élytral, et seule la déclivité apicale demeure alors brun-rouge clair.

♂: Tête aussi longue que large, à base droite, nettement séparée du cou, les angles postérieurs parfois accusés. Vertex subconvexe, lisse, peu ou pas ponctué, avec un sillon plus ou moins profond débutant entre les yeux et s'élargissant sur le métarostre. Yeux grands, saillants, tempes courtes, au plus égales au quart du diamètre oculaire.

Métarostre à peu près aussi long que la tête, peu conique, sillonné dessus et plus ou moins distinctement ponctué sur les faces latérales. Mésorostre normalement élargi, avec un étroit sillon médian. Prorostre droit, cylindrique filiforme, long comme 2,5 à 3 fois le métarostre. Dessous de la tête et du métarostre ponctué.

Antennes de longueur moyenne. Scape renflé et allongé; 2e article petit et cylindrique, 3e conique allongé, 4e à 8e égaux, un peu plus longs que larges, subconiques, plus courts que le 3e. Massue nette : 9e article subconique, 10e tonniforme, 11e cylindrique un peu plus court que les 2 précédents réunis. Pilosité faible sur le funicule, plus abondante avec une pubescence forte sur les articles de la Massue.

Prothorax moyennement allongé (L/1 = 100/60), plus étroit au bord du cou qu'à la base qui est rebordée avec un sillon transversal. Pronotum convexe, avec un sillon médian arrêté au tiers antérieur. Surface avec une ponctuation très fine et très dispersée.

Elytres présentant les caractères du genre, apex arrondis en commun ou subtronqués. 2e côte seule convexe; stries 1 et 2 seules profondes, linéaires, la 2e fortement ponctuée à la base. Les autres stries indiquées par des lignes de très grosses ponctuations.

Tous les fémurs dentés, les intermédiaires plus nettement hirsutes sous la massue. Tibias droits, tarses à articles robustes, le premier non manifestement allongé.

Prosternum lisse, apophyse prosiernale en triangle large, ponctuée et hirsute. Métasternum convexe avec un aplatissement longitudinal. Plaque abdominale avec une large dépression elliptique plus ou moins ponctuée et généralement pileuse. Sternite 3 et 4 lisses et transverses. Sternite apical finement ponctué et pileux.